

3. *A. africanum* Desv. in Berlin. Mag. 5: 322 (1811)

A. sinuatum P. Beauv., Fl. Oware 2: 33 (1816)

A. currori Hook., Sp. Fil. 3: 82 (1860)

Tipo: Benín. Palisot de Beauvois s.n. (P) [Tardieu-Blot (1964a: 180)]

Descripción: Benl (1991: 6); Tardieu-Blot (1964a: 178)

Iconografía: fig. 27

Epífito sobre diversos árboles; 0-1400 m. Regiones tropicales de África. Annobón, Bioko y Río Muni.

ANNOBÓN: Crater Lake, *Wrigley* 202 (K). BIOKO NORTE: Malabo-pico Basilé, *Carvalho* 2136 (MA-419387). CENTRO SUR: P.N. Monte Alén, Mosumu, *Aedo & al.* 5113 (MA-638683), Evinayong, *Guinea* 81 (MA-389181). LITORAL: Bata-Bome, *Carvalho* 5394 (MA-598454); estrada kms. 68-69 después de Emangós, *Carvalho* 6475 (MA-620758). KIE NTEM: Eloan, *Pérez Viso* 4298 (MA-728635). WELE NZAS: Oveng Esandong, *Pérez Viso* 3102 (MA-731343).

Observaciones.—Algunos ejemplares con pecíolos netos o con el ápice con apículos de menos de 2 cm se han asignado a esta especie, aunque presentan estos caracteres de transición hacia *A. subintegrum* C. Chr., Index Filic.: 134 (1905)

