

CLXXXIII. BROMELIACEAE*

1. *Ananas* Mill.

1. **A. comosus** (L.) Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 133 (1917)

Bromelia comosa L., Herb. Amb.: 21 (1754)

A. sativus Schult. fil. in Roem. & Schult. (eds.), Syst. Veg. 7: 1283 (1830)

Tipo: "Habitat [in Amboina]", "*Anassa domestica*"
in Rumphius, Herb. Amboin., 5: 227, tab. 81 (1747)

[Jarvis (2007: 359)]

Descripción: Vanden Berghen (1988: 97)

Iconografía: fig. 1

Planta originaria del SE y S de Brasil hasta Paraguay, que ha sido frecuentemente cultivada y eventualmente naturalizada en todas las regiones tropicales; 0-1000 m. En todo África tropical. Annobón, Bioko y Río Muni.

ANNOBÓN: Crater Lake, *Wrigley & Melville* 291 (BM, K, MA-219279); lago A Pot, *Velayos & al.* 11576 (MA-828148). BIOKO NORTE: Malabo, *Gómez Marín & al.* 130 (MA-856960). LITORAL: Ayamiken, *Obama* 108 (BRLU). WELE NZAS: Nzuamayong, *Lisowski* 655 (BRLU).



*F. Cabezas, C. Aedo, P. Barberá, M. de la Estrella & M. Velayos

Fig. 1. *Ananas comosus*