

CLXXXIV. VELLOZIACEAE*

1. Xerophyta Juss.

1. **X. schnitzleinia** (Hochst.) Baker in J. Bot. 13: 235 (1875) ["schnitzleinia"]

Hypoxis schnitzleinia Hochst. in Flora 27: 31 (1844)

Barbacenia schnitzleinia (Hochst.) Pax in Engl. (ed.), Hochgebirgsfl. Trop. Afr.: 171 (1892) ["schnitzleiniana"]

Tipo: Etiopía. Semien, Sabra, *Schimper 1365* (BM, K)


[<http://www.tropicos.org/Name/1200368,21-X-2010>]

Descripción: Smith & Ayensu (1975: 4)

Iconografía: fig. 2

Habitat y altitud en Guinea Ecuatorial desconocidos. Especie con una amplia y dispersa, población en África, ha sido citada principalmente en las zonas montañosas de la región oriental del continente, desde Etiopía hasta Kenia (Smith & Ayensu, 1974: 189, 1975: 4). Hepper (1968h: 174, sub *Vellozia schnitzleinia* var. *occidentalis* Milne-Redh.) la cita en Nigeria. Río Muni (Guinea, 1946: 258).

Observaciones.—Esta especie ha sido citada de Río Muni, sin ninguna información precisa por Guinea (1946: 258). No hemos encontrado ningún ejemplar de herbario recolectado en Guinea Ecuatorial en las colecciones de los herbarios BM, BRLU, K, LISC, LISU y MA.



*F. Cabezas, C. Aedo, P. Barberá, M. de la Estrella & M. Velayos



Fig. 2. *Xerophyta schinzleinia*