

## CLXXXV. PONTEDERIACEAE\*

1. Estambres fértiles 6; anteras dorsifijas; ovario con 3 lóculos..... **Eichhornia**  
1. Estambres fértiles (1)3, anteras basifijas; ovario con 1 lóculo.....  
..... **Heteranthera** [**H. callifolia** (Cam, Gab)]

### **Eichhornia** Kunth

1. Hojas alternas, dispuestas a lo largo del tallo; pecíolo no inflado; flores solitarias.....  
..... **E. natans** (Gab)  
1. Hojas en roseta, flotantes; pecíolo inflado; inflorescencia en espiga .....  
..... **E. crassipes** (Gab)

No hemos encontrado ningún ejemplar de herbario colectado en Guinea Ecuatorial perteneciente a la familia Pontederiaceae. Hay registros de esta familia tanto en Gabón (Sosef, 2010), como en Camerún (Hepper, 1968g). Tanto el área de distribución como la ecología del grupo hacen muy probable su presencia en Guinea Ecuatorial. Además de las especies ya mencionadas, en *Flora of West Tropical Africa* se incluyen en Camerún *Scholleropsis lutea* H. Perrier, planta colectada una sola vez en ese país y que se conoce también de Chad y Madagascar, y *Pontederia lanceolata* Nutt., planta americana cultivada en las regiones tropicales.

---

\*F. Cabezas, C. Aedo, P. Barberá, M. de la Estrella & M. Velayos