

CXCI. CANNACEAE*

1. *Canna* L.

1. *C. indica* L., Sp. Pl.: 1 (1753)

C. bidentata Bertol. in Mem. Reale Accad. Sci. Ist. Bologna 10: 33 (1859)

Tipo: "Habitat inter tropicos Asiae, Africæ, Americae", herb.


A. van Royen No. 912.356-390 (L) [Jarvis & al. (1993: 29)]

Descripción: Koechlin (1964: 89)

Iconografía: fig. 48

Originaria de América tropical y subtropical, naturalizada en bordes de carretera y zonas de influencia antrópica, en África, se distribuye desde Benín hasta Etiopía, Angola, Zimbabue y Madagascar. Annobón, Bioko y Río Muni.

ANNOBÓN: borde del lago A Pot, *Velazquez* & al. 11558 (MA-831223). BIOKO NORTE: Malabo, Elá Nguema, *Gómez Marín* & al. 118 (MA-854057); *Guinea* 107 (MA-219877). BIOKO SUR: cerca de Luba, barrio de Las Palmas, *Fernández Casas* 11366 (MA-512627). CENTRO SUR: Monte Alén, *Ngomo 261* (BRLU). KIE NTEM: alrededores del poblado de Obot Nku-Eseng, a 7 km de Nsok Nsomo, *Barberá* & al. 185 (MA-831453). LITORAL: Ayamiken, réserve de Río Campo, *Obama* 122 (BRLU).



*F. Cabezas, C. Aedo, P. Barberá, M. de la Estrella & M. Velazquez




Fig. 48. *Canna indica*